

**成分:**玉米糖漿固形物、植物油(精製棕櫚油、大豆油、椰子油、高油酸葵花子油)、牛乳蛋白分離物、礦物質(磷酸鈣、檸檬酸鈉、氯化鉀、檸檬酸鉀、磷酸鎂、碳酸鈣、硫酸亞鐵、硫酸鋅、硫酸銅、硫酸錳、碘化鉀、鎂、氯化鎂、亞硒酸鈉)、大豆卵磷脂、單細胞植物油(高山被孢菌發酵產物、藻油)、提供ARA與DHA、維生素(維生素C、氯化膽鹼、維生素E、維生素K1、維生素A棕榈酸酯、於鹼鹼酸、維生素D3、本多酸鈣、維生素B2、維生素B1、維生素B6、維生素B12、葉酸、生物素)、肌醇、牛磺酸、L-肉鹼、抗壞血酸棕榈酸酯(抗壞血酸)、L-抗壞血酸(抗壞血酸)。本產品含有牛奶製品、大豆製品。

	營養標示	
	每100公克	每100毫升
熱量 Energy	520大卡	68大卡
蛋白質 Protein	10.9公克	1.4公克
脂肪 Fat	28公克	3.7公克
飽和脂肪 Saturated Fat	12.5公克	1.6公克
反式脂肪 Trans Fat	0公克	0公克
52順油酸 Linoleic Acid	4900毫克	640毫克
α-亞油酸 α-Linolenic Acid	420毫克	55毫克
碳水化合物 Carbohydrates	55公克	7.2公克
糖 Sugars	7公克	0.9公克
鈉 Sodium	240毫克	31毫克
水分 Moisture	3公克	90公克
維生素A Vitamin A	480微克 RE	63微克 RE
維生素D Vitamin D	7.8微克 α-TE	1.01微克 α-TE
維生素E Vitamin E	6.6毫克	0.86毫克
維生素K1 Vitamin K1	78微克	10.1微克
維生素B1 Thiamin	420微克	54微克
維生素B2 Riboflavin	470微克	61微克
維生素B6 Vitamin B6	310微克	41微克
維生素B12 Vitamin B12	1.6微克	0.2微克
菸鹼素 Niacin	5.2毫克	0.68毫克
葉酸 Folic Acid	83微克	10.8微克
泛酸 Pantothenic Acid	2600微克	340微克
生物素 Biotin	15.6微克	2微克
維生素C Vitamin C	100毫克	13毫克
膽素 Choline	125毫克	16.2毫克
肌醇 Inositol	88毫克	11.5毫克
左旋肉鹼 L-Carnitine	13毫克	1.7毫克
成分 Ash	3.1公克	0.4公克
鈣 Calcium	600毫克	78毫克
磷 Phosphorus	400毫克	52毫克
鎂 Magnesium	60毫克	7.8毫克
鐵 Iron	8.5毫克	1.1毫克
鋅 Zinc	5.2毫克	0.68毫克
錳 Manganese	310微克	41微克
銅 Copper	390微克	51微克
碘 Iodine	130微克	17微克
硒 Selenium	10.9微克	1.42微克
鉀 Potassium	600毫克	78毫克
氯 Chloride	410毫克	53毫克
鉻 Chromium	10.9微克	1.42微克
鉬 Molybdenum	29微克	3.8微克
二十二碳六烯酸 DHA	88毫克	11.5毫克
二十碳四烯酸ARA	177毫克	23毫克
牛磺酸 Taurine	31毫克	4.1毫克
乳糖 Lactose	0公克	0公克

**開罐說明及保存方式:**

- 將手洗乾淨後開罐。
- 開罐後請將鋁箔蓋丟棄，使用錫膠蓋蓋緊奶粉。
- 請貯存於室溫下，開罐後需蓋緊貯存於乾燥涼爽處，且於1個月內用完。請勿冷凍奶粉，並避免過熱。
- 如果包裝有任何瑕疵，包括鋁箔蓋，請勿使用。

**注意事項:**

- 請勿使用微波爐來加熱奶水，可能會造成嚴重的燙傷。
- 如果沒有依照指示造成沖調不當，將對嬰兒的腸胃造成嚴重傷害，沖調好的奶水，可能很快就會變質。調好之奶水，請立即餵哺，或加蓋冷藏於2-4°C的冰箱中，冷藏時間不得超過24小時。如果調好的奶水超過2小時以上沒有妥善冷藏，請勿繼續餵哺。請勿冷凍沖調好的奶水。
- 調好的奶水一旦開始餵哺後，必須在1小時內餵哺完畢否則請將剩餘奶水丟棄。
- 此奶粉部分是經由噴霧乾燥法製成，在過程中，部分成分可能會被烘乾成深色顆粒。

MeadJohnson 美強生

# 優生 Enfamil

## A+

LactoFree 無乳糖

A+學立方360°

無乳糖配方  
Enfamil A+ LactoFree Care Formula  
For babies when lactose is a concern

✓ 添加鐵質及完整奶蛋白  
✓ 未添加蔗糖

嬰兒配方食品

初生至1歲嬰兒適用  
荷蘭原裝進口  
淨重400公克

美強生營養品公司於1905年成立於美國，是生產嬰幼兒營養品的大型跨國集團，長期致力於以科學實證為基礎的嬰幼兒營養品研發。根據不同年齡實寶所需的營養，美強生研發和生產優生實寶A+系列產品。

美強生優生實寶系列產品

1250706/9658-B7

**重要說明:**母乳最好，母乳是嬰兒的最佳食品。如果情況許可，應以母乳為第一優先的選擇。只有在母乳無法獨自哺育時，才以嬰兒配方奶粉替代母乳。優生A+全護系列無乳糖配方是營養均衡的嬰兒配方奶粉，可以作為母乳不足時的補充或替代。請遵照醫護人員或營養師的建議來決定是否需要餵哺嬰兒配方奶粉及其適當之食用方法。6個月以上的嬰兒使用本產品時，應配合添加副食品。

**奶水調配及使用說明:**實寶的健康決定於謹慎小心的遵照下列沖調指示正確的衛生條件、沖調、稀釋、食用、及儲存對於嬰兒配方的調配是很重要的。嬰兒配方奶粉並非無菌的，除非醫師指示並監督使用，請勿用以餵哺早產兒或有免疫問題的實寶。請詢問醫師適合的嬰兒配方奶粉。

1. 在沖調嬰兒配方前，請務必確實及徹底地以肥皂及清水來洗手。
2. 將乾淨的奶瓶、奶嘴、奶蓋等配件以沸水煮沸1分鐘後，冷卻至40°C備用。
3. 沖調奶水前，將清水煮沸1分鐘後，冷卻至40°C備用。
4. 將所需要的冷卻後的水倒入奶瓶中，再加入奶粉。
5. 蓋上瓶蓋後搖晃均勻。

請參閱下列表中正確的水量及奶粉量沖調。以罐內所附的測量匙來量奶粉，並保持罐內量匙的乾燥。

實寶的年齡(週)	實寶的體重(公斤)	每天餵哺的次數	每一次餵哺的沖調方法		本罐大約可使用的天數#
			奶粉的平匙數	冷卻後的水量(c.c.)	
0-2	3.0	6-7	3	90	4-5
2-4	3.5	6	4	120	4
4-8	4.5	5-6	5	150	3-4
8-12	5.5	5	6	180	3
12以上	5.5以上	4-5	8	240	2-3

#本數字表示當嬰兒只有使用優生A+全護系列無乳糖配方時，若添加副食品，使用天數會增加。以罐內所附量匙為標準，每一量匙(大約4.3公克)的優生A+全護系列無乳糖配方添加30c.c.的水。

製造日期(上行)有效日期(下行)請看罐底(日、月、西元年)請在罐底標示之有效期限內使用。

品名: 優生A+L.F.全護系列無乳糖配方  
輸入廠商及總經理:  
美強生營養品股份有限公司  
臺北市大安區仁愛路三段136號6樓  
製造廠及地址: 美強生營養品公司 荷蘭廠  
Mead Johnson B.V. Middenkempweg 2,  
6545 CJ Nijmegen, The Netherlands  
© 2018 Mead Johnson & Company  
宅配暨免費育兒諮詢服務專線  
(0800)211752  
美強生官網www.meadjohnson.com.tw

