new

32 × 70ml

易碎品輕拿輕放

45 ml
40
35
30
25
20 ml

警告：不正確的調配、儲存、使用及餵食，可能導致嬰兒健康不良影響。**請遵照醫師指示使用本產品。**未經醫生建議切勿稀釋和添加任何其他物質。

使用指南：
(1)開瓶即飲，用前請搖勻
(2)打開瓶蓋，揭開鋁箔
(3)勿使用微波爐加熱
(4)請在一小時內食用完準備好的奶水

雀巢Nestlé

能恩水解

Pre NAN

早產及低體重嬰兒專用奶水

STAGE 1
體重小於1800公克寶寶適用

容量70毫升
德國原裝進口

特殊醫療用途嬰兒配方食品
- ✓ HA部分水解蛋白技術
- ✓ 3.6公克蛋白質/100大卡
- ✓ 提供熱量80大卡/100毫升
- ✓ 添加中鏈三酸甘油酯/MCT
- ✓ 添加鐵質，無添加蔗糖

儲存條件：
置於陰涼乾燥避光的地方(4-25℃)
有效日期：
標示於瓶身(西元年/月/日)
原產地：德國
＊僅供醫院使用
本產品含有：
牛奶製品

DSHL024-1

3 mm

25 ml
30
35
40
45
50 ml

160823

品　　名：雀巢能恩水解早產及低體重嬰兒專用奶水 Stage 1
PreNAN Stage 1
原 產 地：德國
商標權人：瑞士商雀巢製品股份有限公司
Société des Produits Nestlé S.A
進 口 商：台灣雀巢股份有限公司
進口商地址：台北市內湖區瑞光路399號8樓及8樓之1
製 造 商：Nestlé Deutschland AG
製造商地址：Werk Biessenhofen, Füssener Str.1, 87640
Biessenhofen,Germany
儲存條件：置於陰涼乾燥避光的地方(4-25℃)
製造日期與有效日期均標示於外箱(西元年/月/日)
有效日期標示於瓶身(西元年/月/日)

43512075

合格

使用指南：



1. 準備奶水之前請先洗手，並消毒所有器具。
2. 檢查瓶身上標明的有效日期。若瓶身受損，請勿使用。用前請搖勻。
3. 打開瓶蓋，揭開鋁箔。
4. 套上消毒後的奶嘴。勿稀釋本品或替換容器。
5. 檢查奶水的溫度，若需要可將奶瓶置於溫水中加熱，但不要浸濕奶嘴。勿使用微波爐加熱。
6. 請在一小時內食用完準備好的奶水。

雀巢Nestlé

能恩®水解

Pre NAN

STAGE 1
體重小於1800公克寶寶適用

早產及低體重嬰兒專用奶水

成分說明：水、麥芽糊精、乳糖、部分水解乳清蛋白、中鏈三酸甘油酯、低芥子酸菜籽油、高2位-棕櫚酸植物油、葵花油、高油酸葵花油、磷酸鈣、氯化鉀、氫氧化鉀、L-組胺酸、氯化鎂、氫氧化鈉、L-精胺酸、重酒石酸膽鹼、高山被孢黴發酵產物(ARA來源)、藻油 (DHA來源)、磷酸二氫鉀、檸檬酸、維生素C、肌醇、硫酸亞鐵、牛磺酸、維生素E、硫酸鋅、L-肉酸、核苷酸鹽(5′-胞核苷單磷酸鹽、5′-尿核苷單磷酸鹽、5′-腺核苷單磷酸鹽、5′-鳥嘌呤核苷單磷酸鹽)、菸鹼醯胺、L-抗壞血酸棕櫚酸酯(抗氧化劑)、本多酸鈣、混合濃縮生育醇(抗氧化劑)、維生素A粉末、硫酸銅、維生素B_1、維生素B_2、維生素B_6、葉酸、碘化鉀、硫酸錳、維生素K_1、維生素D_3、生物素、硒酸鈉、維生素B_{12}

餵母乳的嬰兒最健康
衛生福利部關心您

真誠推薦
本產品是雀巢根據早產兒及低體重兒的特殊營養需求所設計

優質食品，美好生活
Good Food, Good Life
雀巢
Nestlé

傾心聆聽
0800-000-339
www.nestle.com.tw

特殊醫療用途嬰兒配方食品

營養標示

	每100大卡		每100毫升	
熱量	100	大卡	80.1	大卡
蛋白質	3.6	公克	2.9	公克
脂肪	5	公克	4	公克
飽和脂肪	2.2	公克	1.8	公克
反式脂肪	0	公克	0	公克
亞麻油酸	701	毫克	562	毫克
α-次亞麻油酸	91	毫克	73	毫克
碳水化合物	10.2	公克	8.1	公克
糖	4.7	公克	3.7	公克
鈉	64	毫克	51	毫克
水分	114	公克	87	公克
維生素A	462	微克RE	370	微克RE
維生素D	4.68	微克	3.7	微克
維生素E	4.54	毫克α-TE	3.6	毫克α-TE
維生素K	8.1	微克	6.4	微克
維生素C	26	毫克	21	毫克
維生素B_1	169	微克	135	微克
維生素B_2	247	微克	198	微克
維生素B_6	117	微克	94	微克
維生素B_{12}	0.29	微克	0.23	微克
菸鹼素	2	毫克	1.6	毫克
葉酸	50.6	微克	40.6	微克
泛酸	1	毫克	0.8	毫克
生物素	4.93	微克	3.95	微克
膽素	23.4	毫克	18.7	毫克
肌醇	24.7	毫克	19.8	毫克
左旋肉鹼	2.6	毫克	2.1	毫克
灰分	0.8	公克	0.6	公克
鐵	2.26	毫克	1.8	毫克
鈣	145	毫克	116	毫克
磷	96.1	毫克	77	毫克
鎂	10.4	毫克	8.3	毫克
鋅	1.5	毫克	1.2	毫克
銅	104	微克	83	微克
錳	15.6	微克	12.5	微克
碘	35.1	微克	28.1	微克
鉀	149	毫克	120	毫克
氯	94.8	毫克	75.9	毫克
硒	5.58	微克	4.47	微克
核苷酸	3	毫克	2.4	毫克
牛磺酸	7.9	毫克	6.3	毫克
花生四烯酸(ARA)	18.2	毫克	14.6	毫克
二十二碳六烯酸(DHA)	18.2	毫克	14.6	毫克

其他成分資訊

亞麻油酸/α-次亞麻油酸	7.7
鈣磷比	1.5

32×70毫升

警告：1.不正確的調配、儲存、使用及餵食，可能導致嬰兒健康不良影響。請嚴格按照說明操作。未經醫生建議切勿稀釋和添加任何其他物質。
2.請一直抱著寶寶餵食，以免寶寶嗆到。

餵哺建議：早產兒及低體重嬰兒每日所需之熱量，需經醫師或營養師計算而得。

滲透壓：
271mOsm/L

禁忌症：不適合給確診為牛奶蛋白過敏、乳糖不耐症以及先天代謝疾病，如半乳糖血症、葡萄糖-半乳糖吸收不良的寶寶使用。
不可作為靜脈注射使用。

重要事項：母乳是寶寶最好的營養來源，應盡可能持續餵哺母乳。**使用者請遵照醫師指示使用本產品**，六個月以上之嬰兒使用本產品時應配合添加副食品。本產品為添加鐵質之嬰兒配方食品。

本產品含有：牛奶製品

儲存條件：置於陰涼乾燥避光的地方(4-25℃)

僅供醫院使用

160817

1056062286