

Enfapro A+ 品名：
優寶A+較大嬰兒配方奶粉(新升級)

成分：濃縮乳清蛋白(牛乳)、植物油(精製棕櫚油、椰子油、大豆油、高油酸葵花子油)、玉米糖漿固形物、乳糖(牛乳)、脫脂乳粉(牛乳)、半乳寡糖(GOS)、聚糖精(PDX)、大豆卵磷脂(乳化劑)、礦物質(碳酸鈣、磷酸鈣、硫酸亞鐵、硫酸鋅、硫酸銅、硫酸錳、碘化鈉、亞硒酸鈉)、單細胞植物油(高山椒迴轉發酵產物、藻油)提供ARA與DHA、維生素(維生素C、氯化膽鹼、維生素E、維生素A棕櫚酸酯、菸鹼醯胺、維生素K1、維生素D3、本多酸鈣、生物素、維生素B2、維生素B1、維生素B6、葉酸、維生素B12)、氫氧化鉀(酸度調節劑)、肌醇、牛磺酸、核甘酸(5'-胞核甘單磷酸鹽、5'-腺核甘單磷酸鹽、5'-尿核甘單磷酸鹽、5'-鳥嘌呤核甘單磷酸鹽)、抗壞血酸棕櫚酸酯及抗壞血酸(抗氧化劑)、麥芽糊精。本產品含有牛奶製品及大豆製品。

營養標示		
	每100公克	每100毫升
熱量 Energy	470 大卡	70 大卡
蛋白質 Protein	15.5 公克	2.3 公克
脂肪 Fat	22 公克	3.2 公克
飽和脂肪 Saturated Fat	8 公克	1.2 公克
反式脂肪 Trans Fat	0 公克	0 公克
亞麻油酸 Linoleic Acid	2900 公克	430 公克
碳水化合物 Carbohydrates	56 公克	8.3 公克
糖 Sugars	37 公克	5.5 公克
鈉 Sodium	210 毫克	31 毫克
水分 Moisture	2.4 公克	90 公克
維生素A Vitamin A	420 RE	63 RE
維生素D Vitamin D	7.1 微克	1.04 微克
維生素E Vitamin E	7.3 毫克	1.08 毫克
維生素K1 Vitamin K1	33 微克	4.9 微克
維生素B1 Thiamin	330 微克	49 微克
維生素B2 Riboflavin	1030 微克	153 微克
維生素B6 Vitamin B6	330 微克	49 微克
維生素B12 Vitamin B12	2.4 微克	0.36 微克
菸鹼素 Niacin	3.7 毫克	0.55 毫克
葉酸 Folic Acid	94 微克	13.9 微克
泛酸 Pantothenic Acid	3300 微克	490 微克
生物素 Biotin	14.6 微克	2.2 微克
維生素C Vitamin C	94 毫克	13.9 毫克
灰分 Ash	3.4 公克	0.5 公克
鈣 Calcium	530 毫克	78 毫克
磷 Phosphorus	310 毫克	45 毫克
鎂 Magnesium	56 毫克	8.3 毫克
鐵 Iron	6.6 毫克	0.97 毫克
鋅 Zinc	4 毫克	0.59 毫克
錳 Manganese	94 微克	13.9 微克
銅 Copper	350 微克	52 微克
碘 Iodine	118 微克	17.4 微克
硒 Selenium	11.8 微克	1.74 微克
鉀 Potassium	710 毫克	104 毫克
氯 Chloride	440 毫克	65 毫克
二十二碳六烯酸 DHA	80 毫克	11.8 毫克
二十二碳四烯酸 ARA	160 毫克	24 毫克
α-次亞麻油酸 α-Linolenic Acid	260 毫克	39 毫克
膽素 Choline	113 毫克	16.7 毫克
肌醇 Inositol	38 毫克	5.6 毫克
牛磺酸 Taurine	31 毫克	4.5 毫克
糖質纖維(牛乳寡糖) GOS	1.3 公克	0.2 公克
糖質纖維(聚糖精) PDX	1.3 公克	0.2 公克
核甘酸 Total nucleotides	19.3 毫克	2.9 毫克

開罐說明及保存方式：



(1) 將手洗乾淨後開罐。



(2) 開罐後請將鋁箔丟棄，使用塑膠蓋蓋緊奶粉。如果包裝有任何瑕疵，包括鋁箔，請勿使用。

未開罐產品請存放在乾燥涼爽處。開罐後產品，請勿放置於過熱溫度環境下，應存於乾燥涼爽處，並於1個月內用完。

製造日期(上行)有效日期(下行)
請看罐底(日、月、西元年)
請在罐底標示之有效期限內使用。

宅配暨免費育兒諮詢服務專線
(0800)211752
美強生官網 www.meadjohnson.com.tw

輸入廠商及總經銷：
美強生營養品股份有限公司
臺北市大安區仁愛路三段136號6樓
製造廠及地址：
美強生營養品公司 荷蘭廠
Mead Johnson B.V. Middenkampweg 2,
6545 CJ Nijmegen, The Netherlands
© 2018 Mead Johnson & Company

此奶粉部分成分係經噴霧乾燥法製成，過程中可能會被烘乾成深棕色顆粒。

新
升級配方

科學營養



✓ 添加鐵質
✓ 未添加蔗糖
較大嬰兒配方奶粉
較大嬰兒配方輔助食品



6-12個月嬰兒適用
荷蘭原裝進口
淨重900公克

美強生營養品公司於1905年成立於美國，是生產嬰幼兒營養品的大型跨國集團，長期致力於以科學實證為基礎的嬰幼兒營養品研發。根據不同年齡寶寶所需的營養，美強生研發和生產優生寶寶A+系列產品。

美強生優生寶寶系列產品

Enfapro A+ 品名：
優寶A+較大嬰兒配方奶粉(新升級)

重要說明：母乳最好，母乳是嬰兒的最佳食品，如果情況許可，應以母乳為第一優先的餵哺選擇。只有在母乳無法親自餵哺母乳時，才以嬰兒配方奶粉替代母乳。如果您選擇使用嬰兒配方奶粉，請諮詢醫師選擇合適的嬰兒配方。優寶A+是營養均衡的較大嬰兒配方奶粉，適用於6個月以上嬰兒，可以作為母乳不足時的補充或替代品。請遵照醫護人員或營養師的建議來決定是否需要餵哺嬰兒配方奶粉。副食品的添加及其適當之食用方法，本產品不適宜六個月以下的嬰兒使用。6個月以上的嬰兒使用本產品時，應配合添加副食品。

奶水調配及使用說明：

正確的衛生條件、沖調、稀釋、食用、及儲存對於嬰兒配方的調配是很重要的。嬰兒配方奶粉並非無菌的，除非醫師指示並監督使用，請勿用以餵哺早產兒或有免疫問題的寶寶。請詢問醫師適合的嬰兒配方奶粉。



1. 在沖調嬰兒配方前，請務必確實及徹底地以肥皂及清水來洗手。
2. 將乾淨的奶瓶、奶嘴、奶嘴蓋等隨時器具以沸水煮1分鐘消毒。
3. 沖調奶水前，將清水煮沸1分鐘後，冷卻至40°C備用。
4. 將所需要的冷卻後的水倒入奶瓶中，再加入奶粉。
5. 蓋上瓶蓋後搖晃均勻。

餵哺表：請依照下列表中正確的水量及奶粉量沖調。以罐內所附的量匙來量奶粉，並保持罐內量匙的乾燥。

寶寶的年齡	冷卻後的水量(c.c.)	優寶A+奶粉平匙數	每日餵哺次數#
6個月及以上	180 240	6 8	3-6 2-4

#請配合副食的添加狀況，酌以增減。

以罐內所附量匙為標準，建議的沖調比例是每一量匙(大約4.9公克)的優寶A+較大嬰兒配方奶粉添加約30c.c.的水。

- 注意事項：請勿使用微波爐來加熱奶水，可能會造成嚴重的燙傷。
- 如果沒有依照指示造成沖調不當，將對嬰兒的健康造成嚴重傷害。沖調好的奶水，可能很快就會變質。調好之奶水，請立即餵哺，或加蓋冷藏於2-4°C的冰箱中，冷藏時間不得超過24小時。此外，請勿冷卻沖調好的奶水。
 - 調好的奶水一旦開始餵哺後，必須在1小時內餵哺完畢否則請將剩餘奶水丟棄。



衛生福利部關心您

1076031326