

沖調一餐量(一湯匙嬰兒配方重量為8.3公克)

- 徹底沖洗奶瓶、奶嘴、瓶蓋和沖泡時使用的所有器具。
- 沖泡器具用水洗淨後，煮沸5分鐘。
- 請於潔淨的桌面進行沖調工作。
- 另取鍋子，取足量的水煮沸5分鐘後待冷卻備用。
- 正確量取煮沸過的溫開水，倒入消毒過的奶瓶中。
- 請使用罐內量匙取一點配方，用乾淨的餐刀刮平。
- 每60毫升溫開水，加入一平匙(罐內所附量匙)Q10心美力HMO1嬰兒配方。
- 蓋上瓶蓋，輕輕搖動使配方溶解，測量溫度後再繼續哺餵。
- 1小時內未食用完畢，請將剩餘的奶水倒棄。

嬰兒體重(公斤)	嬰兒年齡	沖調一餐用溫開水(毫升)	沖調一餐用配方(平匙數)	每日總哺餵次數
低於3.5	初生~2週大	60	1	8-10
3.5-5.5	2週~2個月大	120	2	6-7
5.5-7.5	2-6個月大	180	3	5-6
7.5及以上	6個月及以上	180	3	4-5

重要說明
母乳是嬰兒最佳的營養來源，以母乳哺育的時間愈長愈好。食用嬰兒配方食品前，應請教專業醫護人員或營養師的建議與指示，確認是否需要，並遵照正確的沖調及食用方法。
Q10心美力HMO1嬰兒配方，能提供寶貴均衡營養，可作為母乳無法親自哺餵母乳、母乳分泌不足、斷奶或使用輔助食品時，銜接母乳嬰兒食品。本產品不適用於半乳糖血症患者。

保存方式
未開罐的配方請存放正常室溫，一旦開罐後，應蓋好罐蓋貯存於乾燥處(不需放入冰箱)，並請於三週內食用完畢。

注意事項
請向醫師諮詢嬰兒的餵哺量。此僅為建議餵哺量，每個嬰兒可能不同。6個月以上嬰兒使用本產品時，應額外添加其他副食品。

請依循醫師或營養師指示使用。正確的衛生條件、沖調方式及貯存對於嬰兒配方的調配非常重要，調配不當可能會影響嬰兒健康。
• 嬰兒配方並非無菌，除非經醫師指示，不建議用以餵哺早產兒或可能有免疫問題之嬰兒。
• 本產品是經由噴霧乾燥法製成，在生產過程中可能出現少數之深色微粒。
• 沖調前務必將水及所有沖調器具煮沸5分鐘，待冷卻後使用，並以罐內量匙量取配方，謹慎遵照沖調指示。
• 若沖調罐哺一次以上的量，請務必將沖調好的奶水冷藏於2-4°C的冰箱，並請於24小時內食用完畢。一旦開始哺餵，應於一小時內食用完畢，剩餘的奶水請倒棄。
• 請勿使用微波爐加熱開水調配或加溫本配方奶水，以免導致嚴重燙傷。
• 本產品含牛奶、大豆及其製品。

for code use



Similac 心美力

嬰兒配方

1 0-12 個月適用



添加鐵質嬰兒配方食品

淨重400公克 歐洲原裝進口

	每100公克	每100毫升*
能量	517	64
蛋白質	10.6	1.3
脂肪	28.2	3.5
總脂肪	8.9	1.1
飽和脂肪	0	0
反式脂肪	4.5	0.6
亞油酸	45.0	6.0
α-亞油酸	56.1	7.0
碳水化合物	53.5	6.7
糖	14.4	1.8
鈉	45.3	5.6
水分	2.3	0.3
維生素A	8	1
維生素D ₂	14.8	1.8
維生素E	54	7
維生素K	80	10
維生素C	0.60	0.07
維生素B ₁	1.0	0.1
維生素B ₂	0.4	0.05
維生素B ₆	1.2	0.15
維生素B ₁₂	3.2	0.4
煙酸	76	9
鈣	20	2
磷	80	10
鎂	7.5	0.9
鐵	2.8	0.3
鋅	380	47
銅	224	28
錳	40	5
碘	625	78
鉀	350	44
鈉	4.5	0.6
氯	5.4	0.7
鈣	400	50
磷	100	12
鎂	100	12
鐵	8.6	1.1
鋅	29	3.6
銅	91	11.3
錳	61	7.6
碘	1.8	0.2
鈉	1.6	0.2
氯	0.2	0
維生素A	54	7
維生素D ₂	11.7	1.5
維生素E	4.9	0.6
維生素K	58	7.2

成分說明

脫脂牛奶、乳脂、高油酸葵花籽油、濃縮乳清蛋白、大豆油、椰子油、果寡糖(FOS)、水解乳清蛋白、檸檬酸鈣、高山椒孢菌發酵產物(AA來源)、2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)、大豆卵磷脂、羧基鈣、冠氏氏甲油(DHA來源)、維生素C、重酒石酸鎂、羧基鈣、高油酸紅花籽油、羧基鈣、麥芽糊精、牛磺酸、L-色氨酸、肌醇、5'-胞核苷單磷酸鹽、硫酸亞鐵、L-抗壞血酸、核糖醇(抗氧化劑)、氯化鈉、5'-鳥嘌呤核苷、磷酸鹽、5'-尿嘧啶核苷、葡萄糖、乙胺-d-α-生育醇、維生素E、硫酸鎂、5'-腺苷核苷、磷酸鹽、酒石酸、維生素B₁₂、羧基鈣、羧基鈣、本多酸鈣、羧基鈣、L-肉桂、維生素A、檸檬酸、硫酸鎂、氯化鈣、磷酸鈣、維生素B₁、維生素B₂、維生素B₆、硫酸鎂、葉黃素、葉黃素、β-胡蘿蔔素、維生素K、碘化鉀、生物素、硫酸鎂、維生素D₂、維生素B₁₂。

*天然維生素E來源

讓母乳的嬰兒最健康

衛生福利部關心您

亞培育嬰專線：0800-008-828
<https://www.abbott-nutrition.com.tw/similac/>

品名：亞培心美力HMO1
 添加鐵質嬰兒配方食品
 進口商：美商亞培股份有限公司 台灣分公司
 地址：台北市民生東路二段51號6樓
 製造廠：美國亞培大藥廠亞培閣分公司
 廠址：Abbott Ireland, Droimire West, Cootehill, Co. Cavan, Ireland

for code use

製造(MFG)及有效(EXP)日期：請看罐底(日/西元年)
 原產地：愛爾蘭

*每60毫升溫開水加入一匙(罐內所附量匙)Q10心美力HMO1嬰兒配方 ©2020 Abbott

1096025507

沖調一餐量(一湯匙嬰兒配方重量為8.3公克)



徹底沖洗奶瓶、奶嘴、瓶蓋和沖泡時使用的所有器具。



沖泡器具用水洗淨後，煮沸5分鐘。



請於潔淨的桌面進行沖調工作。



另取鍋子，取足量的水煮沸5分鐘後待冷卻備用。



正確量取煮沸過的溫開水，倒入消毒過的奶瓶中。



請使用罐內量匙取一匙配方，用乾淨的餐刀沿匙口刮平。



每60毫升溫開水，加入一平匙(罐內所附量匙)亞培心美力HM.O1嬰兒配方。



蓋上瓶蓋，輕輕搖動使配方溶解，測量溫度後再餵哺嬰兒。



1小時內未食用完畢，請將剩餘的奶水倒棄。

嬰兒體重(公斤) 低於	嬰兒年齡	沖調一餐用量		每日餵哺次數
		煮沸過的溫開水(毫升)	配方平匙數	
3.5	初生-2週大	60	1	8-10
5.5	2週-2個月大	120	2	6-7
7.5	2-6個月大	180	3	5-6
7.5及以上	6個月及以上 ¹	180	3	4-5

請向醫師諮詢嬰兒的餵哺量。此僅為建議餵哺量，每個嬰兒可能不同。6個月以上嬰兒使用本產品時應額外添加其他副食品。

注意事項

●請依循醫師或營養師指示使用。正確的衛生條件、沖調方式及貯存對於嬰兒配方之調配非常重要，調配不當可能會影響嬰兒健康。●嬰兒配方並非無菌，除非經醫師指示，不建議用以餵哺早產兒或可能有免疫問題之嬰兒。●本產品是經由噴霧乾燥法製成，在生產過程中可能出現少數之深色微粒。●沖調前務必將水及所有沖調器具煮沸5分鐘，待冷卻後使用，並以罐內量匙量取配方，謹慎遵照沖調指示。●若沖調餵哺一次以上的量，請務必將沖調好的奶水冷藏於2-4°C的冰箱，並請於24小時內食用完畢。一旦開始餵哺，應於一小時內食用完畢，剩餘的奶水請倒棄。●請勿使用微波爐加熱開水調配或加溫本配方奶水，以免導致嚴重燙傷。●本產品含牛奶、大豆及其製品。

重要說明

母乳是嬰兒最佳的營養來源，以母乳哺育的時間愈長愈好。食用嬰兒配方食品前，應請教專業醫護人員或營養師的建議與指示，確認是否需要，並遵照正確的沖調及食用方法。
亞培心美力HM.O1嬰兒配方，能提供實質均衡營養，可作為母親無法親自哺餵母乳、母乳分泌不足、斷奶或使用輔助食品時，銜接母乳嬰兒食品。
本產品不適用於半乳糖血症患者。

保存方式

未開罐的配方請存放正常室溫；一旦開罐後，應蓋好罐蓋貯存於乾燥處(不需放入冰箱)，並請於三週內食用完畢。

for code use



Similac

心美力

嬰兒配方

1 0-12 個月適用



HMO

添加鐵質嬰兒配方食品

e 淨重 850 公克

歐洲原裝進口

營養標示

	每100公克	每100毫升*
熱量	517 大卡	64 大卡
蛋白質	10.6 公克	1.3 公克
脂肪	28.2 公克	3.5 公克
飽和脂肪	8.9 公克	1.1 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
亞麻油酸	4.5 公克	0.6 公克
α-次亞麻油酸	450 毫克	60 毫克
碳水化合物	56.1 公克	7.0 公克
糖	53.5 公克	6.7 公克
鈉	144 毫克	18 毫克
水分	2.3 公克	90.8 公克
維生素A	453 微克 RE	56 微克 RE
維生素D ₃	8 微克	1 微克
維生素E	14.8 毫克 α-TE	1.8 毫克 α-TE
維生素K	54 微克	7 微克
維生素C	80 毫克	10 毫克
維生素B ₁	0.60 毫克	0.07 毫克
維生素B ₂	1.0 毫克	0.1 毫克
維生素B ₆	0.4 毫克	0.05 毫克
維生素B ₁₂	1.2 微克	0.15 微克
菸鹼素	5 毫克	0.6 毫克
泛酸	3.2 毫克	0.4 毫克
葉酸	76 微克	9 微克
生物素	20 微克	2 微克
膽素	80 毫克	10 毫克
肌醇	32 毫克	4 毫克
左旋肉鹼	7.5 毫克	0.9 毫克
灰分	2.8 公克	0.3 公克
鈣	380 毫克	47 毫克
磷	224 毫克	28 毫克
鎂	40 毫克	5 毫克
鉀	625 毫克	78 毫克
鈉	350 毫克	44 毫克
氯	4.5 毫克	0.6 毫克
鐵	5.4 毫克	0.7 毫克
銅	400 微克	50 微克
錳	100 微克	12 微克
碘	8.6 微克	1.1 微克
牛磺酸	29 毫克	3.6 毫克
葉黃素	91 微克	11.3 微克
β-胡蘿蔔素	61 微克	7.6 微克
膳食纖維	1.8 公克	0.2 公克
果寡糖(FOS)	1.6 公克	0.2 公克
2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)	0.2 公克	0 公克
二十二碳六烯酸(DHA)	54 毫克	7 毫克
花生四烯酸(AA)	112 毫克	14 毫克
單元不飽和脂肪酸	11.7 公克	1.5 公克
多元不飽和脂肪酸	4.9 公克	0.6 公克
核甘酸當量	58 毫克	7.2 毫克

*每60毫升溫開水加入一匙(罐內所附量匙)亞培心美力HM.O1嬰兒配方

成分說明

脫脂牛奶、乳糖、高油酸葵花籽油、濃縮乳清蛋白、大豆油、椰子油、果寡糖(FOS)、水解乳清蛋白、檸檬酸鉀、高山被孢菌發酵產物(AA來源)、2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)、大豆卵磷脂、碳酸鈣、冠氏隱甲藻油(DHA來源)、維生素C、重酒石酸膽鹼、氯化鎂、高油酸紅花籽油、氫氧化鉀、麥芽糊精、牛磺酸、L-色氨酸、肌醇、5'-胞核甘單磷酸鹽、硫酸亞鐵、L-抗壞血酸、棕櫚酸酯(抗氧化劑)、氯化鈉、5'-鳥嘌呤核甘單磷酸鹽、5'-尿核甘單磷酸鹽、葡萄糖、糖-d-α-生育醇酯(維生素E)、硫酸鋅、5'-腺核甘單磷酸鹽、混合濃縮生育醇(抗氧化劑)、菸鹼、本多酸鈣、葵花籽油、L-肉酸、維生素A、棕櫚酸酯、硫酸銅、氯化鈣、磷酸鈣、維生素B₁、維生素B₆、維生素B₁₂、硫酸錳、葉黃素、葉酸、β-胡蘿蔔素、維生素K、碘化鉀、生物素、酒酸鈉、維生素D₃、維生素B₂。



亞培育嬰專線：
0800-008-828
<https://www.abbott-nutrition.com.tw/similac/>
品名：亞培心美力HM.O1
添加鐵質嬰兒配方食品
進口商：美商亞培股份有限公司台灣分公司
地址：台北市民生東路三段51號6樓
製造廠：美國亞培大藥廠愛爾蘭分廠
廠址：113 Ireland, Dromore West, Cootehill, Co. Cavan, Ireland
製造(MFG)及有效(EXP)日期：
請看罐底(日/月/西元年)
原產地：愛爾蘭

©2020 Abbott for code use

1096025507